

✓ ~~กรมการแพทย์~~ ~~อนาถาชน~~ ~~กรม~~
☐ กองคลัง
☐ กองร่าง
☐ กองการสื่อสาร
ด่วนที่สุด

ชร ๐๐๒๓.๑๙/๑๐๑๙



อบต.แม่พริก
รับที่ ๑๑๘
วันที่ 1.8 เม.ย. 2566
เวลา

ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ๕๗๑๘๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/ว ๙๐๘๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

พร้อมหนังสือนี้ อำเภอแม่สรวย ได้ส่งหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร ๐๐๒๓.๖/ว ๙๐๘๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็ดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

๓. หากพบว่าสุนัขหรือแมวที่กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/mJySTuo> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ส่งทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิรินุช จันทapun)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอแม่สรวย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร / โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๓๗๗



โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหาร เจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม

กลืนลำบาก กลืนน้ำ

คันรุนแรง

อัมพาตตาย

บริเวณที่เคยถูกกัด

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง ม่านตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เหา่หอน

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

อย่าแหยม

อย่าเหยียบ

อย่าแยก

อย่าหยิบ

อย่ายุ่ง

คาถา ๕ ย

กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค


ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน




ใส่ยา เบตาดีน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง

มาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คู่หมั้น

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน



อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เบื่ออาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท
คลุ้มคลั่ง



ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจล้มเหลว
หัวใจหยุดเต้น โคม่า
และเสียชีวิต



๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้
ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด
รีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน

